

B2 SZÓBELI
GYÓGYSZERÉSZ SZAKIRÁNY
SZAKEMBER – SZAKEMBER SZITUÁCIÓ

MINTAFELADAT


Helyszín: Oktatási tanintézmény

Résztvevők: Oktató (vizsgázó)

Gyógyszerész rezidens (vizsgáztató)

Feladat: Tájékoztassa kollégáját a rühesség gyógyszeres kezeléséről:


- a rühesség chlor-ciclohexan tartalmú emulzió vagy zselé, ill. benzil-benzoát oldattal megszüntethető
- tisztálkodás után, majd fél órával később megismételve az egész testet le kell kenni
- a fertőzött bőrnek 24 órán keresztül bekenve kell maradnia
- makacs fertőzés esetén a kezelést még kétszer meg kell ismételni
- a viszkető bőrfelület vakarását kerülni kell, mert a vakarás olyan sebeket ejtethet a bőrön, amelyek elfertőződhetnek
- ha nagyon erős a viszketés, kortikoszteroidos krémek alkalmaznak csillapítására
- az atkák elpusztulása után a bőrön jelenlevő elváltozások általában rövid idő alatt maguktól eltűnnek



B2 SZÓBELI
GYÓGYSZERÉSZ SZAKIRÁNY
SZAKEMBER – SZAKEMBER SZITUÁCIÓ

MINTAMEGOLDÁS

- Die Krätze kann mit einer Chlorcyclohexan haltigen Emulsion oder einem Gele und mit einer Benzyl- Benzoat-Lösung behandelt werden.
- Nach dem Waschen und eine halbe Stunde später sollte man die Haut am ganzen Körper eincremen.
- Die infizierte Hautpartie muss 24 Stunden lang eingecremt bleiben.
- Im Falle einer hartnäckigen Infektion muss die Behandlung noch zweimal wiederholt werden.
- Die juckende Hautstelle darf nicht gekratzt werden, weil das Kratzen Wunden auf der Haut verursacht, die zu einer Superinfektion führen können.
- Wenn es sehr juckt, kann eine kortikosteroidhaltige Creme angewendet werden, um das Jucken zu lindern.
- Nach dem Absterben der Milben verschwinden auch die Hautveränderungen in kurzer Zeit.



B2 SZÓBELI
GYÓGYSZERÉSZ SZAKIRÁNY
SZAKEMBER – KLIENS SZITUÁCIÓ


MINTAFELADAT

Helyszín: Gyógyszertár

Résztevők: Gyógyszerész (vizsgázó)
34 éves férfibeteg (vizsgáztató)

Feladat: A beteg álmatlanságban és nyugtalanságban szenved. Ön a Sedacur forte tablettát javasolta neki. Tájékoztassa a beteget a gyógyszer használatával kapcsolatban:

- a Sedacur forte olyan gyógyszer, melyet gyógynövény kivonatokból állítottak össze
- kiegyensúlyozott hatóanyag tartalma miatt napközbeni alkalmazása nyugtató hatású
- esti, a lefekvést megelőző bevitel esetén elősegíti az elalvást és nyugodt alvást biztosít
- a gyógyszer szokásos adagja 1-2 tablettára naponta 2-3 alkalommal
- ha altatóként szeretné használni, akkor lefekvés előtt egy órával vegyen be 1-2 tablettát
- mellékhatásként ritkán gyomor-bélrendszeri panaszok és nagyon ritkán allergiás bőrkiütések fordulhatnak elő
- a mellékhatások a gyógyszer szedésének abbahagyása után általában megszűnnek



B2 SZÓBELI
GYÓGYSZERÉSZ SZAKIRÁNY
SZAKEMBER – KLIENS SZITUÁCIÓ

MINTAMEGOLDÁS

Guten Tag! Wie kann ich Ihnen helfen?

- Ich empfehle Ihnen das Medikament Sedacur forte gegen Schlaflosigkeit und Unruhe. Dieses Mittel wird aus pflanzlichen Extrakten gewonnen.
- Die Wirkstoffe des Mittels sind ausgeglichen. Deswegen kann es auch tagsüber genommen werden und wirkt beruhigend.
- Wenn Sie das Mittel am Abend vor dem Schlafengehen nehmen, hilft es beim Einschlafen und sichert einen ruhigen Schlaf.
- Die übliche Dosierung des Mittels ist 1-2 Tabletten 2-3-mal am Tag.
- Wenn Sie das Mittel als Schlafmittel anwenden wollen, dann sollten Sie 1-2 Tabletten eine Stunde vor dem Schlafengehen einnehmen.
- Als Nebenwirkungen können selten Magen-Darmbeschwerden auftreten und in sehr seltenen Fällen allergische Hautreaktionen.
- Wenn Sie einer der Nebenwirkungen bemerken und die Tabletten absetzen, verschwinden die Symptome von selbst.