


<p><b>PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA</b></p> <p>Alapfok – német nyelv Szóbeli Beszédértés</p>		<p>vizsgázó sorszáma:</p> <p>◀◀◀◻</p> <p>dátum: 2007. 04. 14.</p>
---	--	---

*Oldja meg a két feladatlapot a hallott szöveg alapján! Elérhető pontszám: 20 pont  
Figyelem! A vizsga akkor lehet sikeres, ha a vizsgázó részegységenként legalább 40%-ot teljesít.  
Végső megoldásként csak a tintával írt változatot fogadjuk el.  
Kérjük, hogy jól gondolja meg a választát, mivel bármilyen válaszmódosítás esetén válasza érvénytelen.*

**MEGOLDÓKULCS**

### **Transzkripció**

#### Was zu tun, wenn das Kind Autokrankheit hat?

Ein Kind, das die sogenannte „Autokrankheit“ hat, ist zuerst sehr ruhig. Es wird immer mehr blass. Dann können kalter Schweiß, stärkere Speichelbildung auch auftreten. Später kommen Übelkeit und Schwindel dazu. Die führen schliesslich zum Erbrechen.

#### Ratschläge:

- Die Fahrt auf die Nacht oder den frühen Morgen legen.
- Vor der Abfahrt für eine entspannte Atmosphäre sorgen; wenn das Kind aufgeregt ist oder Angst hat, tritt die Autokrankheit viel mehr auf.
- Vor der Abfahrt wenig essen, vor allem Fette vermeiden; empfehlenswert ist eine leichte Mahlzeit (Kekse, Crackers, Brot) und nicht zu viel Flüssigkeit.
- Das Kind muss immer in stabiler und gleicher Position sitzen, am besten in seinem Sitz mit dem Sicherheitsgurt angeschnallt.
- Das Auto muss man regelmässig lüften, man darf nicht rauchen und kein Deo verwenden.
- Das Kind sollte nach vorne und nicht zur Seite schauen.
- Wenn das Kind Hunger hat, kann man ihm Kekse geben, aber nicht zu viel Flüssiges.
- Kurze und häufige Fahrunterbrechungen sind sehr nützlich.
- Wenn das Kind blass wird, halten und einen kurzen Spaziergang machen.
- Wenn das Kind erbricht, sollte man Wasser und Handtuch zur Hand haben.

Achtung: Es sind schon tödliche Unfälle passiert, weil sich die Kinder aus dem fahrenden Auto hinausbeugten, denn sie wollten beim Erbrechen nicht das Wageninnere beschmutzen.

(221 szó, 1173 n)

<p><b>PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA</b></p> <p>Alapfok – német nyelv Szóbeli Beszédértés</p>		<p>vizsgázó sorszáma:</p> <p>◀◀◀◻</p> <p>dátum: 2007. 04. 14.</p>
---	--	---

*Oldja meg a két feladatlapot a hallott szöveg alapján! Elérhető pontszám: 20 pont*  
*Figyelem! A vizsga akkor lehet sikeres, ha a vizsgázó részegységenként legalább 40%-ot teljesít.*  
*Végső megoldásként csak a tintával írt változatot fogadjuk el.*  
*Kérjük, hogy jól gondolja meg a választát, mivel bármilyen válaszmódosítás esetén válasza érvénytelen.*

### Megoldókulcs

1. **Stärkerer Speichelfluss, Übelkeit**
2. **Igaz, Hamis, Hamis**
3. **Position, Sitz**
4. **c, b, c**

<p><b>PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA</b></p> <p>Alapfok – német nyelv Szóbeli Beszédértés</p>		<p>vizsgázó sorszáma:</p> <p>◀ ◀ ◀ ◻</p> <p>dátum: 2007. 04. 14.</p>
---	--	--

*Oldja meg a két feladatlapot a hallott szöveg alapján! Elérhető pontszám: 20 pont  
Figyelem! A vizsga akkor lehet sikeres, ha a vizsgázó részegységenként legalább 40%-ot teljesít.  
Végső megoldásként csak a tintával írt változatot fogadjuk el.  
Kérjük, hogy jól gondolja meg a választát, mivel bármilyen válaszmódosítás esetén válasza érvénytelen.*

## MEGOLDÓKULCS

### **"Risiko Bauchumfang"**

Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute begrüße ich in unserem Studio Hannelore Schunkert, Professorin für Kardiologie an der Universitätsklinik in Lübeck.

**Frau Prof. Schunkert, Schlaganfall ist eine sehr häufige Todesursache. Viele haben ein erhöhtes Schlaganfallrisiko. Frau Professor, wie kann man sein persönliches Risiko herausfinden?**

Der Hausarzt kann das Schlaganfallrisiko ganz einfach bestimmen. Er überprüft die Herz-Kreislauf-Risiken. Diese sind: Bluthochdruck, Zuckerkrankheit, Rauchen, Herz-Kreislaufkrankheiten in der Familie oder erhöhter Blutcholesterinspiegel.

Viele Risikofaktoren hängen aber auch mit einem größeren Bauchumfang zusammen. Wenn der Bauchumfang bei Männern mehr als 94 Zentimeter und bei Frauen mehr als 80 Zentimeter ist, kann man drei von den vier Risikofaktoren finden.

#### **Wie kann man Schlaganfälle verhindern?**

Bewegung und gesunde Ernährung spielen eine wichtige Rolle, und man muss schädliche Substanzen wie Alkohol und Zigarettenrauch vermeiden.


Bei einer medikamentösen Therapie müssen der Arzt und der Patient zusammen herausfinden, welche Mittel individuell am besten wirken und verträglich sind.

#### **Viele nehmen die ersten Symptome eines Schlaganfalls nicht ernst. Wann wird es kritisch?**

Sobald erste Symptome wie Lähmungen, Sehstörungen oder Sprachstörungen auftreten, sollte man sofort einen Notarzt rufen. Jede Minute zählt, um Gewebe zu retten, das von der Durchblutungsstörung bedroht ist.

**Frau Prof. Schunkert, wir danken Ihnen für das Gespräch.**

*<http://www.netdokter.de/feature/schlaganfall.htm> 204 szó*

<p><b>PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA</b></p> <p>Alapfok – német nyelv Szóbeli Beszédértés</p>		<p>vizsgázó sorszáma:</p> <p>◀ ◀ ◀ ◻</p> <p>dátum: 2007. 04. 14.</p>
---	--	--

*Oldja meg a két feladatlapot a hallott szöveg alapján! Elérhető pontszám: 20 pont  
Figyelem! A vizsga akkor lehet sikeres, ha a vizsgázó részegységenként legalább 40%-ot teljesít.  
Végső megoldásként csak a tintával írt változatot fogadjuk el.  
Kérjük, hogy jól gondolja meg a választát, mivel bármilyen válaszmódosítás esetén válasza érvénytelen.*

### Megoldókulcs

1. Egészítse ki a mondatokat a hallott szöveg alapján. (3 pont)

1. 1. Frau Doktor Schunkert arbeitet als Professorin für **Kardiologie** in Lübeck.

1. 2. Schlaganfall ist eine sehr **häufige** Todesursache.

1. 3. **Viele** haben ein erhöhtes Schlaganfallrisiko.

2. Igazak (I) vagy hamisak (H) az alábbi állítások? Csak a megfelelő válasz betűjelét írja a kockákba. (3 pont)

2. 1. Die Bestimmung des Schlaganfallrisikos ist sehr kompliziert. **H**

2. 2. Probleme mit der Blutbildung erhöhen das Schlaganfallrisiko. **H**

2. 3. Auch ein größerer Bauchumfang ist mit den Risikofaktoren verbunden. **I**

3. Karikázza be a hiányzó szó betűjelét a hallott szöveg alapján. (1 pont)

Arzt und Patient müssen entsprechende Medikamente \_\_\_\_\_ finden.

a. allein

b. besprochen

c. **zusammen**

4. A betegségre utaló tünetek közül mely hármát említi a szöveg? Jelölje x-szel! (3 pont)

szédülés	bénulás	alvászavar	látászavar	beszédzavar
	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>